

AMAUTA

WAYRA Cuaje

Fertilizante especialmente diseñado para favorecer el cuajado de frutos, con aporte de Boro (B), Fósforo (P) y Molibdeno (Mo).

COMPOSICIÓN

N Total



N Amoniacal



P₂O₅



B



Mo



BENEFICIOS

- Promueve el cuajado de flores, aumentando el número de granos.
- Potencia el crecimiento de frutos.
- Mejora la condición nutricional de cultivos para procesos de fotosíntesis y removilización de azúcares hacia destinos definidos.
- Aporta aminoácidos que eficientizan el uso de los micronutrientes aplicados.

PRESENTACIÓN

Bolsa 5 kg.



DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Cultivo	Momento	Dosis
Alfalfa	Después del corte, cuando haya rebrote	1 - 1.5 kg/ha. Repetir cada 3 cortes
Almendro	Durante brotación y post cosecha previo a la caída de hojas	1 - 3 kg/ha
Cítricos	En separación de los botones florales	1 - 3 kg/ha
Frutales de carozo	Floración y desarrollo de fruto	1 - 3 kg/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Frutales de pepita	Prefloración y floración	1 - 3 kg/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Girasol	Desde 4 hojas a prebotón floral	1 - 2.5 kg/ha
Hortícolas	Prefloración-floración y desarrollo de fruto	1 - 2.5 kg/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Maíz	Desde 6 a 10 hojas	1 - 2.5 kg/ha
Maní	Desde prefloración	1 - 2.5 kg/ha
Olivo	Prefloración y floración	1 - 2.5 kg/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Papa	Desde brotación a tuberización	1 - 2.5 kg/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Pistacho	Prefloración y floración	1 - 2.5 kg/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad
Soja	Inicio de floración (R1) hasta plena floración (R3)	1 - 2.5 kg/ha
Trigo	Z4.0 a Z6.5 junto al fungicida	1 - 2.5 kg/ha
Vid	Prefloración y floración	1 - 2.5 kg/ha. Repetir a los 10-14 días según necesidad

Se aconseja no mezclar con sulfato de amonio. Se recomienda realizar un análisis de suelo previo para ajustar la dosis a aplicar y cubrir los requerimientos del cultivo.

Para más información, consultar con el técnico de Amauta Agro en la zona.